Landwirtschaftliche Beilage

Förderung des Siedlungswesens.

Die Anträge und Interpellationen der Reichsparteien im Reichstag zur Förderung der inneren Kolonisation, deren Behandlung an anderer Stelle eingehend geschildert haben, sind inzwischen erfolgreich geworden, da der Reichstag in seiner Sitzung vom 8. d. M. den Anträgen einstimmen Antrag genehmigte. Darin wird die Reichsregierung ersucht, zur Förderung des ländlichen Siedlungswesens in den dazu geeigneten Gebieten für die nächsten fünf Jahre einen Betrag bis zu 20 Millionen Mark in den Reichsmark bereit zu stellen, der zur Beschaffung eines größeren Landvorrats und Beschaffung von Siedlungsgelände dienen soll. Der Beschluß bedarf noch der Zustimmung des Haushaltsausschusses.

Förderung der Anliegersiedlung.

Der Siedlungsausschuß des Preußischen Landtags hat beschlossen, dem Plenum des Hauses zu empfehlen, den zu genehmigen, das Staatsministerium ersucht wird:

1. Die Bundesratsinitiative anzuweisen, in zu verbreiten Fällen auf die Erwerbung von Land für Anliegersiedlungen durch Gesetz oder Verordnung hinzuwirken, daß die Anliegersiedlungsvorsätzen besonders Bedacht zu nehmen.

2. Die Anliegersiedlung ganz besonders dadurch zu fördern, daß auch den vom Landtag bewilligten Millionen Aufwendungen die Möglichkeit gegeben bleibt, der Wertsteigung selbst, vor allem auch den Kleinsiedlern, die durch die Anliegersiedlung erst eine selbständige Wirtschaftsexistenz erhalten.

3. Eine Statistik vorzulegen, in welcher freiwillig eingegangene, in angemessener Frist zu erledigende Anträge auf Gewährung von Anliegersiedlungsbeihilfen vorgelegt worden sind.

Neuheiten der Gartenkunst.

Einst waren die Franzosen die führenden Gartenkünstler unter den Völkern. Großer Meister der Blumenzucht war eine französische Domäne. Durch die Gartenkunstausstellung ist vor dreihundert Jahren eine verwirrende Fülle von Neuheiten bei uns eingebürgert worden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts haben die Engländer ihre Vorherrschaft auf diesem Gebiet an die Engländer abtreten müssen. Steigender Wohlstand in diesen ärmsten Industriestaat der Welt hat die Gartenkunst gefördert. Schon auf einem Sport reicher Leute gemacht, die sich keine Gelegenheit, ihren Reichtum zu zeigen, entgehen lassen. Weltberühmt sind die Engländer auch mehr als ein anderes Volk für die Mannigfaltigkeit ihrer Gärten in Verbindung gebracht; auf die Vielfältigkeit ihrer Anlagen, die neue Bilder hervorrufen in der englischen Garten und Landschaftsgärtnerei, die Gartenbaukunst entwickelt und regen an neuen Kombinationen und Zusammenstellungen. Die Engländer sind auch in der Anwendung neuer Gartenbaumaterialien immer wieder zu internationalen Führern geworden.

Die diesjährige Ausstellung hat wieder manches Neue gebracht. Neben farbenen Orchideen und es eine neue, sogenannte Farbe, die „Chrysanthemum-Farbe" genannt, die ungefähr 70 Meter Blumenumfang verlangt. Ferner Rosen in Gelb, Rosa und Weiß, ohne Rhododendren, schwarze und blaue Tulpen und eine neue Abstufung von Citrus-Blüthen sowie die seltsamen „Gartenzwerge" auf, ein Baum, den die Chinesen als Lieblingsbaum bezeichnet haben.

Bei dem Eröffnungsbankett hielt der Präsident, Sir Harry Veitch, eine Ansprache, in der er sagte, daß er zur Zeit stolz auf eine Neuheit auf dem Gebiet der Blumenzüchtung sei, die nun auch auf den Namen „Rose Veitch" getauft hat, da ihr eine Rose „Veitch's Perfection" zu Pate gestanden hat. Sie ist eine Kreuzung von Rose Wichuraiana und Rose Hybrida. Sie ist ganz besonders geeignet für Bepflanzung von Abhängen und Böschungen, da sie sich sehr schnell ausbreitet, wo sie einmal Wurzel gefaßt hat. Sie ist ferner sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten und Ungeziefer. Sie ist ferner in dichten Büschen dicht beieinander gepflanzt, so daß sie einen dichten Blumenteppich bildet, der sich bei der Blüte fast vollständig verdeckt. Sie ist ferner in dichten Büschen dicht beieinander gepflanzt, so daß sie einen dichten Blumenteppich bildet, der sich bei der Blüte fast vollständig verdeckt. Sie ist ferner in dichten Büschen dicht beieinander gepflanzt, so daß sie einen dichten Blumenteppich bildet, der sich bei der Blüte fast vollständig verdeckt.

Solche Taubenuhr haben zwei wichtige Nachteile. Erstens kann sie nicht die Geschwindigkeit des Taubenschwarms in der geschilderten Spezialität, wenn die Tauben in Gruppen zu 10 bis 20 Stück aufsteigen, damit sie auf den Taubenboden nicht stehen tun. Zu keiner in diesen Turmen die Schlupflöcher einander gegenüber sind. Zweitens kann man nicht wissen, ob die Tauben die Gegend nicht schon kennen. Zu keiner in diesen Turmen die Schlupflöcher einander gegenüber sind. Zweitens kann man nicht wissen, ob die Tauben die Gegend nicht schon kennen. Zu keiner in diesen Turmen die Schlupflöcher einander gegenüber sind. Zweitens kann man nicht wissen, ob die Tauben die Gegend nicht schon kennen.

Einträgliche Gänsezucht.

Ein häufiger Fehler in der Gänsehaltung ist die Jugend. Die Tiere werden klein und bleiben auch klein. Die richtige Ernährungsweise ist in diesem Fall die Eintränkung eine kräftigen Zuchtfutters. Dann werden sie schon in kurzer Zeit stattliche Tiere, die reichlich Fleisch und Fett ansetzen. Ein Mittel, das auf 100 Zentnerfutter eine Mischung von 30 Kilogramm Kleie, 30 Kilogramm Gerstenschrot und 40 Kilogramm Roggenschrot enthalten. Die Mischung wird mit kochendem Wasser zu einem dicken Brei angerührt und dann mit Salz und Kümmel gewürzt. Dieses Futter ist nicht nur sehr nahrhaft, sondern auch sehr billig. Es ist ferner sehr leicht verdaulich und regt die Verdauungsorgane an. Die Tiere gedeihen gut und werden schnell fett. Sie sind dann in kurzer Zeit schlachtreif und können verkauft werden.

Der Preis, den einem guten Zuchterfolg führt, ist eine gute Fütterung. Grünfutter ist die Hauptnahrung. Daher ist die Weide unerläßlich. Der Besitz einer Weide ist für die Gänsehaltung Bedingung. Ein Morgen Weide kann auf 100 Zuchtgänse etwa 10 Morgen, auf 150 Zuchtgänse 15 Morgen groß sein. Ist eine Weide nicht vorhanden, so muß man sich eine Weide schaffen. Dazu ist ein Stall nötig, der für 100 Gänse 30 Quadratmeter groß sein muß. Der Stall muß gut gelüftet sein, aber vor Zugluft geschützt sein. Er muß ferner trocken sein. Die Gänse müssen ihn gern aufsuchen. Sie müssen sich darin wohlfühlen. Sie müssen sich darin wohlfühlen. Sie müssen sich darin wohlfühlen.

Geschlechtsmerkmale bei Küken.

Es wäre von großer Bedeutung, wenn man im Voraus erkennen könnte, ob beim ausgebrüteten Eigen Hähnchen oder Hennen entschlüpfen werden. Die mannigfachsten Versuche sind in der Absicht hin diese Vorhersage bereits aufgestellt worden und werden von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben, ohne sicheren Erfolg zu bringen. Eifarben und Eigewicht sollen maßgebend sein, das sibirische Pendel soll geheimnisvolle Kräfte besitzen, die funktionen. Auch die Bilderzeichnung soll Aufschluß geben. Alle diese Versuche sind bisher ohne durchschlagenden Erfolg.

Etwas einfacher liegt die Frage schon bei der Erkennung des Geschlechts der jungen Küken. Besonders des Augenmerk wird hier den Kopffarmen ge-

schenkt. Der Kopf des Hühnchens — links im Bilde — soll nicht so hart gewölbt, daß im Gegensatz schmäler und auch der Schnabel ist feiner und hat nicht so starken Hornansatz wie beim kräftigen Hahn. Auch die Kolenwölbe sollen bei Hühnchen schwächer sein als beim Hennenküken. Auch den ersten Wochen verliert sich die hintere Kopfwölbung beim Hahnenküken etwas rascher, doch ist sie auch dann noch deutlich.

Die genannten feinen Unterschiede in der Körperform erfordern zur einigermaßen sicheren Erkennung natürlich einen geschulten Blick und vielen immer unsicher. Andere Züchter glauben das Geschlecht an der Stimme der Küken erkennen zu können. Auch ihnen im jungen Alter das Hühnchen, das Hähnchen, die Hähne die Schreier sein.

Taubenturm.

Das nachstehende Bildchen ist zeigen, wie die Behausung der Tauben nicht eingerichtet sein soll, obwohl solche Taubenstürme noch recht häufig angetroffen sind. Man darf sie nicht wenigen Hühnen setzen sie gradezu als kleine Zierstücke.

Die Endivie.

Die Endivie kann sehr vorzüglich auf ein abgeräumtes Frühbeet gezogen werden. Gegen Ende des Oktobermonat eingestellt werden; Saatzeit Ende Juni bis Anfang Juli. Früheren Aussaaten müssten, indem die Pflanzen „Schossen" und spätere Aussaaten können nicht mehr recht zur Entwicklung. Etwa einen Monat nach der Aussaat werden die Pflanzen verzogen in Reihen mit 40 Zentimeter Abstand aufgepflanzt. Die verlangen guten, allgedüngten Boden, denn in trockenen Sommern gedeihen sie schlecht. Die geringste Bodenart sind Gerüben; am ungeeignetsten ist Sand. Die Endivie ist ein Salat, wie der Kopfsalat. Das wird ihren großen Wert für die Küche aus. Denn durch die moderne Ernährungsweise haben wir den Wert der Salate, die in früheren Jahrhunderten den Körpern erst recht schätzen gelernt. Der Endivien-Salat kann auch in Form von Gemüse zubereitet und verspeist verlangen. Man kann zwar auch in Sommer- Oliven- und -Essig Endivien-Salat verspeisen, aber in diesen beiden Monaten Blüthen breit den Boden bedecken an einem trockenen Tage mit den Spitzen zusammen, damit sie gut zusammenbinden, damit sie dort bleiben, denn von Natur aus bildet die Endivie, im Gegensatz zum Kopfsalat, keine feste Herzblätter. Ein Kopfsalat ist Bitter. Will man dagegen den Endivien-Salat für den Winter haben, so dürfen die Pflanzen nicht aufgebunden werden, sondern müssen im Herbst möglichst im Freien stehen und werden mit den Blättern in einen heißen, trockenen und luftigen Keller eingeschlagen und dort in Sand eingeschlagen. So stehen sie im Winterlager von selbst und können bis in den Februar gebleicht werden.

Digitized by Google

Staatshilfe und Selbsthilfe.

In der letzten Zeit haben sich bei verschiedenen Gelegenheiten leitende Staatsmänner über die gegenwärtigen Nöte unserer Landwirtschaft und die Mittel zu ihrer Behebung ausgesprochen.

Als Ziel wird immer wieder betont, der Landwirtschaft müsse ein erträglicher Verdienst ermöglicht werden. Das soll erreicht werden durch eine Verminderung von Steuern und Lasten, durch Mithilfe bei Reichsentschuldungsämter Dr. Hoolitius in Breslau auf: „Mein und Staat können zwar in gewissen Umfange helfen und werden es auch tun, aber letzten Endes muß die Landwirtschaft sich selbst heraus helfen, alle die Hilfsmittel, die wir ihr geben sind, um sie auf der Höhe der Zeit einer besseren Zukunft entgegenführen." Deutsche Landwirtschaftsminister Dr. Steiger zum Ausdruck:

„Unsere Aufgabe ist es, die Produktionsförderung so zu entwickeln, daß der inländischen Erzeugung soviel wie möglich Absatz, daß auch in weiterer günstigen Jahren ein Einfuhrüberschuß an Brotgetreide nicht notwendig ist."

Zinsermäßigung.

In einer Wahlrede in Mecklenburg hatte der Reichsministerpräsident Dr. Brüning erklärt, sein Ministerium habe die weitere Sitte für die Landwirtschaft in einer Höhe von 2 Milliarden Mark für die Preditmarktes. Deshalb sei es nötig gewesen, den Diskontsatz der Reichsbank zu senken.

Im Anschluß an die Notverordnung hat auch erfolgte Herabsetzung des Reichsbankdiskonts hat bald darauf bei den Privatbanken zu einer Herabsetzung des Zinsfußes geführt. Der Satz für die von ihr ausgegebenen Privatkredite gleichfalls auf 6% Prozent herabgesetzt.

Dagegen hat der Landwirtschaftsminister Dr. Schiele wies es sich aus einen Anfragen der Deutsch-Berliner Presse, daß mit einem weiteren von 2—3% ab zu erfolgen Gewalt in der Reichsbank-Direktorium geben muß die Grundlösung gegenüber dem Ausdruck von der nächsten Reichsbankdirektorium. Es ist nicht möglich, daß, soweit der Wechsel über 3 Monate, vom 7. Juni 1930 ab herabgesetzt, und der Diskont 7 Tage nach Ausstellung, und der Diskont 7 Tage nach Ausstellung, daß die Diskontsätze der Reichsbank ab erfolgen soll.

Als Hoffnung klang, daß der Landwirt bei den Kreditinstituten (Sparkassen, Kreditgenossenschaften) zu zahlen hat, sind 8% Prozent einschließlich aller Provisionen mit sachlicher Auswahme des Reichsbankdiskonts, der Belohnung beliebt werden darf, festgesetzt.

Ein neuer Untergrundwühler.

Unter den maschinellen Neuerungen, die auf der Breslauer Ausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft zum erstenmal der Öffentlichkeit vorgeführt wurden, kommt dem Untergrundwühler der Pflugfabrik Sohr, Oberhursdt für die große Wichtigkeit der Grundsätze einer besonderen Beachtung zu. Er erinnert sich es auch dem kleineren Besitzer, da die Vorteile der Untergrundlüftung wenigstens in mäßigem Umfange auch an eine ganze Reihe bekannter Pflugtypen ohne besondere Vorrichtungen und Mühe angebracht werden können.

Von den Vorzügen der Neukonstruktion sei zunächst das bequeme Einsetzen und Ausheben

des Untergrundschlägers vom Stand des Pflugführers aus hervorgehoben. Der Pflugführer bei Arbeit normalerweise einmal, zwecks Einstellung zu verlassen. Ferner kann der Untergrundschläger auf die gewünschte Tiefgang zwischen 5 und 15 Zentimeter unter Furchensohle eingestellt werden. Ist ein Verstellung durch den Gutsbesitzer freigegeben, so bringt er durch die eigene Schwere selbsttätig auf die weiter eingestellte Tiefe. Ein weiterer Vorteil ist auch die Vermeidung der Verstopfung. Trotz der Untergrundlockerung am engen Stellen, die eine bedeutende Kraft, welche den Untergrundhub automatisch nach oben anbreichen läßt. Dem Bekannten der Untergrundlockerung ist auch die vorherige Pflegearbeit zurück. Auch bei wenige Boden werden auf dem Acker gut gelockert, ohne besondere Art. Die neue Vorrichtung gestattet es, die Untergrundlockerung zusammen mit dem Pflügen vorzunehmen und erfordert nicht einen neuen Arbeitsgang. Es wird also nicht mehr Zeit benötigt als zum gewöhnlichen Tiefpflügen ohne oder neue Kraft. Mit schwachen Zugtieren ist hier nicht viel auszurichten. Doch alle Erfahrungen sprechen dafür, daß der Mehrverbrauch an Zugkraft ein und als die Aufschwungsstellen voll

durch hyrere und engere Furchenfolge wettgemacht werden.

Es gilt noch immer das Wort unserer Vorväter, daß ein Schuß in Acker liegt. Nur muß man es verstehen, ihn in rechtem Sinn und rechtzeitem Fleiß zu erteilen und zu geben.

Stand der Viehseuchen.

Allgemein, wenn Frühjahrsbestellung und Weideauftrieb das Hindernis starker in Benutzung bringen, pflegt auch die Maul- und Klauenseuche bei uns wieder einen stärkeren Ausbreitung zu beginnen und sich auch in diesem Jahr. Am 31. April war die Maul- und Klauenseuche in 1 Gemeinden in Deutschland. Am 15. Mai hatte sich deren Zahl schon auf 1467 vermehrt und ist schließlich am 31. Mai auf 16 268 Gemeinden in Deutschland gestiegen. Dagegen ist die Schweineseuche weiterhin im Abnehmen begriffen, und zwar hat sie gegenüber von 274 Gehöften am 15. Mai auf 200 Gehöfte am 31. Mai d. J. abgenommen.

Unser heimischer Viehstand hat bekanntlich unter der Maul- und Klauenseuche in den letzten Jahren große Lehung erfahren. Damals war das Hauptstreben auf die Erhaltung möglichst großer Bestände hingerichtet. Heute ist das Haupthindernis für Besitzer-Neuanlagen wieder beseitigt worden und steht unter bestimmter Hand in Verbindung vor allem mit dem Handel und den Viehverwaltungen. In diesem Zusammenhang sei auf die Bekanntmachung des Landrats in Anzeige.

Ein gutes Mittel, um dem gegenwärtigen Stand bieter Lage gab auf der Hauptsitzung des Reichsverbands der Deutschen Landwirtschaftlichen Genossenschaften Dr. Müller, vom Forschungsinstitut für Bodenkunden in Goran. In seinem Vortrag über die Naturordnung und Bewirtschaftung der Ackerböden der Jahren 1931 und 1925 legte er dar, wie in den letzten Jahren in der Bewirtschaftung der Ackerböden in Bezug auf das Ausgangsmaterial große Fortschritte gemacht worden sind. Eine gute Düngung muß jedoch stets auf einer Hoffnung des Bodens sich erneben durch Klacht in der Steigerung der Erträge. Dies ist aber nur möglich durch eine Lang-fortgesetzte Arbeit. Die weitere Entwicklung, die an eine gute Düngung anschließt, ist eine zweimalige Kalkung. Endlich muß sie eine hohen Ertragsertrag von Morgen und eine gute Samenernte erzielen, um so für die nächste Bodenbestellung ein Bodenkapital zu bieten. Der Vortragende gab einen Überblick über die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen und die Versuche, die von verschiedenen Stellen mit ihnen vorgenommen worden sind. Alle Untersuchungen haben gezeigt, daß die Ursache der Ertragsschwankungen hier die gemeinsame Bodenursache ist. Es ist daher notwendig, daß die Bodenuntersuchungen weiter ausgebaut werden, wie auf die Qualität. Besonders genannt zu werden verdienen die Richtungen von v. Hahn, Petersburg, Wiesbaden, Stuttgart und Hohenheim. Die Ernährung von bewußten Richtungen beim Bodenbau sind heute schon in der Lage, Ertragsschwankungen auf dem Bestimmte konturenzsicher zu machen.

Der Obstwickler.

Eine Zuweisel ist der Obstwickler der bekannteste und verbreitete Schädling des Kernobstes und er ist englisch bereits seit Jahrhunderten bekannt gebildet. Es gibt neunanden, der nicht schon einmal über die Maden in Obst geklagt hätte. Aber unter den Obstarten ist es vor allem der Apfel, der mit verschwindenden Ausnahmen angreifbar. Man bekommt es, wenn es saftig ist, am meisten zu spüren. Die Bezeichnung „Wurmsichtig" oder „madig" ist, man erkauft sich auch einmal, wenn gerade eine besondere Plage Schadenfroh angetroffen ist, die durch den Genuß reichlich aufgewogen werden.

Die Lebensweise des Schädlings. Der Obstwickler ist ein Falter, der seine Eier einzeln ablegt, besten Vorderflügel mit vielen grauschwarzen und braunschimmernden Querbinden versehen gezeichnet sind. In der Nähe lebt er die eines Zentimeter langen Hinterflügel dagegen sind einfarbig. Man kann die Kleinen Falter die Obstbäume in den langen Abendstunden umschwärmen. Sie sind dann besonders leicht zu fangen. Die Weibchen legen ihre Eier auf die jungen Früchte oder Blätter ab. Nach 8—14 Tagen entschlüpfen ihnen winzige Räupchen, die sich sofort in die Frucht hineinfressen und der jungen Frucht einbohren. Sie leben von Fruchtfleisch und Kernen und verraten sich oft schon äußerlich daran, daß die im Innern der Wände sich ansammelnden Kotmassen durch einen Spalt nach außen gedrückt werden. Nach etwa vierzehn Tagen Leben jene Raupe mehrere Früchte und verläßt sie dann, um sich in einem Kokon an einem Baum zur Erde herab und setzen auf die Suche nach einem zur Winterruhe geeigneten Platz. Diesen finden sie gewöhnlich in der rissigen Borke der Obstbäume selbst. Hier verpuppen sie sich in einem Gespinst, in dem sie den Winterschlaf halten. Dauern bleiben, aus denen die Schmetterlinge schlüpfen, die sehr warmen Jahren bringen die Raupen schon im Herbst zur Verpuppung, so daß eine zweite Generation den Winterung folgen. Hier Raupen kommen mit den Früchten in den Handel, wo sie manchmal und besonders sich best in Mauerritzen, Zäunen und dergl. ein.

Der Kampf gegen den Obstwickler richtet sich zunächst gegen die Raupen, die gesammelt werden. Hier werden schon von ihren natürlichen Feinden, den Meisen, verfolgt, wenn diese sich an den Obstbäumen Spechten ihre Nester und Bäume die Stöße Raupenbänder nach den Verlieren der Schädlinge absuchen. Wichtig ist es, daß die Bäume gut gepflegt sind und nicht rechtzeitig zu Pflanzenschutz. Bei seiner Verwendung können viele Obstwicklerraupen unschädlich gemacht werden. Aber das genügt nicht. Man muß den im Freien rechtzeitig entschlüpften Raupen Fallen stellen.

Das geschieht dort, wo sie ihre Winterpuppe sammeln pflegen. Das ist am unteren Ende der Baumstämme. Hier werden Madenfallen oder Fangbänder angebracht. Die einfachste Fangvorrichtung ist ein Stück Papierstreifen, die mit einem Strick oder Bastschnur, die ½ bis 1 Meter hoch über der Erde angebracht werden. Zieht sodann die Raupen zum Verpuppen aus. Eine weitere Verbesserung stellen Leimringe dar. Sie werden in der Weise angelegt, daß man einen Streifen Papier oder dergl. um den Stamm bindet und mit einem Leimring bestreicht. Der Leimring wird am oberen Rande des Streifens angelegt, damit die Raupe durchkommen kann. Der untere Rand ist durch einen Faden festgebunden, damit hier keine Raupen in unterkriechen und sich zwischen den Rippen verpuppen.

Die Fangzeit werden spätestens Anfang Juli unterlegt, diese Fangbänder werden so angenommen und die Gespinnste entfernt und vernichtet. Man sieht dabei darauf, daß nützliche Insekten, die sich zu Zerstörungszwecken unter der Rinde einfinden, wie Spinnen und Ameisenkäfer, geretten werden, da sie den Schädlingen sehr nützlich sind. Besonders bei Absuchen der Schädlinge leicht dadurch erreichen, daß man die Bäume in den Abendstunden absuchen bringt, die einige Stunden lang in einem Back- oder Brutofen der Hitze ausgesetzt werden. Die Fangzeit ist deshalb so lange zu betreiben, bis die Ernte gegen den Frostzunner zu bewahren, empfiehlt sich nicht.

Die einzelnen Mittel haben nur geringen Erfolg, wenn sie nicht gemeinsam vorgehen. Soviel wandern die Falter auf den Nachbargrundstücken wieder ein.

Gartenstand.

Durch den im Garten fühlen und schließlich auch wohnen Mai sind im allgemeinen die Saaten nicht so versunken aufgewesen, wie man es noch dem kommerlichen Frühjahr gewohnt zu können. Aufs besondere Unterplanzungen Beeten haben sich nur wenige enttäuscht. Dagegen ist das Saatbeet vielfach nur wenig günstige Aussichten bieten. In den Gleichfeldern sind auch hinreichende Ungeziefer und Unkräuter aufgetreten.

Das Düngerstreuen hat in großen und ganzen seinen Abschluß gefunden. Die Arbeiten sind auch arbeitsleicht als bereitsdem bereitet. Die Bestellung für Sommergetreide ist durchweg beendet. Die Bestellung und Bodenbestellung ist durchweg günstiger als bei den Wintergetreidesaaten. Die Wärmere Witterung der letzten Tage hat die Entwicklung der Sommerfrüchten sehr gefördert und ein weiteres besseres Aufgehen derselben wie in April ermöglicht. Wo Sommergetreide nach Hackfrüchten, namentlich auch Rüben, bestellt ist, sind die Aufgänge durchweg gut.

Die Bodenbearbeitung gegenüber dem Vorjahr einmal in Rückstand geblieben. Das Aufsuchen der Kartoffeln vollzieht sich nur langsam und häufig unzulänglich, weil auch hier die Nachwirkungen der starken Frostschäden erlitten, der sich jedoch inzwischen wieder verwachsen hat. Die Rüben sind gut aufgelaufen und stehen verheißungsvoll.

Tierische Schädlinge sind auch im Berichtsmonat wieder in recht unliebsamer Weise aufgetreten. Insbesondere werden wieder Schädlingen durch Mäuse, Drahtwürmer, Schnecken und Engerlinge. Auch Blattläuse sind wieder vereinzelt in auch durch Engerlinge, Kastäfer und Rüsselkäfern an den Pflanzen schon angerichtet worden. Auch über Blattläuse ist Krankheiten wird häufig berichtet; vor allem neben Mehltau auch dem Meltau an Roggen, Pflanzenkrankheit an Gerste und Kleefrosch.